



De som får tilbud om stilling ved Nordlandssykehuset HF vil motta helseattest/egenerklæring sammen med tilbudet.

Helseattest - Egenerklæring

Navn		Fødselsdato	
Adresse		Avdeling	
Postnummer/sted		Stilling	
Telefon		Startdato	

Før du kan begynne hos oss skal du lese denne informasjonen nøye og sørge for at alle opplysninger er utfylt og returnert til arbeidsgiver. Ufullstendig utfylt skjema / manglende vedlegg av kopi av testresultat vil medføre at din startdato må forskyves, eventuelt at arbeidsforholdet ikke kan tiltredes.

Helseattesten skal besvares maksimum 3 uker før du skal begynne i arbeid ved Nordlandssykehuset HF. Skjemaet fylles ut og skal være arbeidsgiver i hende god tid før tiltredelse. Eventuelle utgifter forbundet med prøvetaking kan senere refunderes av Nordlandssykehuset HF.

Helseattesten fylles kun ut ved ansettelse men vilkårene består gjennom arbeidsforholdet, dvs. at hvis du utsettes for ny eksponering for MRSA eller tuberkulose gjennom arbeidsforholdet forplikter du deg til å gjennomføre testing som fremgår av helseattesten.

Tuberkulosekontroll

1. Ansatte som de siste 3 år har oppholdt seg mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose¹ og som skal tiltre eller gjeninntre ved Nordlandssykehuset HF, skal fremvise resultat fra tuberkuloseundersøkelse som er tatt etter slike opphold.
2. Ansatte som de siste 3 år har arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller lignende i land med høy forekomst av tuberkulose, skal testes uavhengig av oppholdets varighet.
3. Ansatte som ikke er BCG-vaksinert og som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tuberkulosedagnostikk eller som ønsker det selv, kan tilbys BCG-vaksine. Ta kontakt med Nordlandssykehusets bedriftshelsetjeneste (BHT) om dette er aktuelt for deg.

MRSA-testing

For å unngå spredning av MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker), er alle sykehus i Norge pålagt å føre kontroll med ansatte som kan ha blitt bærere av MRSA.

Vaksinetilbud

Nordlandssykehuset tilbyr flere vaksiner til ansatte basert på hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre i sykehuset. Oversikt over disse finnes i sykehusets kvalitetssystem, ta kontakt med nærmeste leder for avklaring av hvilke vaksiner som er aktuelle for deg.

¹ Informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose, er angitt på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: <http://www.fhi.no/>

Tuberkulose (TB)	JA	NEI
1. Har du siste 3 år oppholdt deg mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose (TB) ¹ ?	☐	☐
2. Har du siste 3 år uansett varighet, arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller krigssoner i land med høy forekomst av TB?	☐	☐
Hvis ja på 1 eller 2 Hvilke(t) land: _____ Tidsrom: _____		
Kan du dokumentere TB-undersøkelse tatt etter opphold i land med høy forekomst av TB?	☐	☐
Hvis JA , vennligst vedlegg kopi av resultatet Hvis NEI , kontakt BHT eller smittevernpersonell for å avklare om du trenger ny TB-undersøkelse. Hvis det er nødvendig, henvend deg til vaksinasjonskontor eller BHT for ny TB-undersøkelse, og legg ved kopi av resultatet.		
3. Er du BCG-vaksinert?	☐	☐
Hvis NEI , kan det være aktuelt å tilby deg vaksine. Ta kontakt med din leder for avklaring om det er aktuelt for deg ut fra dine arbeidsoppgaver.		

MRSA-Testing ²	JA	NEI
Har du:		
1. Fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)?	☐	☐
2. Bodd i samme husstand som MRSA-positiv i løpet av de siste 12 måneder?	☐	☐
3. Hatt nær kontakt ³ med MRSA-positiv uten bruk av adekvat verneutstyr de siste 12 måneder?	☐	☐
Har du de siste 12 måneder vært i land utenfor Norden og der;		
4. Arbeidet/hospitert/vært innlagt i helseinstitusjon?	☐	☐
5. Hatt dagbehandling > 4 timer, dagkirurgi eller omfattende tannbehandling?	☐	☐
6. Oppholdt deg i barnehjem eller flyktningmottak/-leir?	☐	☐
Har du siste 12 måneder oppholdt deg sammenhengende mer enn 6 uker i land utenfor Norden, og:		
7. Har hud-/sårinfeksjon eller kroniske hudlidelser?	☐	☐
8. Har innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner	☐	☐

Hvis JA på spørsmål 1, er utvidet MRSA- prøvetaking nødvendig hvis det ikke foreligger negative prøver på 1,2,3 uker samt etter 3,6 og 12 mnd ⁴. Vennligst ta kontakt med nærmeste leder. Leder tar kontakt med smittevernpersonell ved behov for vurdering.

Hvis JA på spørsmål 2-8, må vi ha ett sett negative MRSA-prøver fra nese, svelg og eventuelt sår, eksem eller innlagt medisinsk utstyr som stomi og lignende. Prøven tas hos egen lege maksimum 2 uker før oppstart hos oss. Svar skal være klart før oppstart.

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er korrekte. Eventuell nødvendig dokumentasjon er vedlagt.

Signatur:

Dato:

Sted:

¹ Informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose, er angitt på [Folkehelseinstituttet sine hjemmesider](#).

² MRSA-veileder, kap 4.1. Tilgjengelig på [Folkehelseinstituttet sine hjemmesider](#).

³ a) Hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv, og én eller begge hadde sår, b) Flere ganger hudkontakt med kjent MRSA-positiv, og begge hadde hel hud, c) Arbeidet med kjent MRSA-positiv pasient som ikke isoleres, d) Selv arbeidet eller vært pasient i helsetjeneste med pågående MRSA-utbrudd

⁴ Kontrollprøver tas 1, 2 og 3 uker etter at saneringen og eventuell systemisk antibiotikabehandling ble avsluttet. Nye kontrollprøver anbefales etter 3, 6 og 12 måneder. Se mer informasjon i [smittevernhandboken \(FHI\) – kontroll etter sanering av MRSA](#).